

5 juni 2020

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Druif (bedekte boomkwekerij)	dompelbehandeling	Esca <sup>1</sup>	0,2 kg/hL**	-	4 (zie tabel Toepassingstijdstip)	-	-
Druif (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Esca <sup>1</sup>	0,2 kg/ha***	0,2 kg/ha	2	7	-
Tomaat (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis <sup>2</sup>	5-10 g/100 L water	0,15 kg/ha	8	5	1

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* 100 L water voor 3x1000 planten (de dompelveleistoof in de container kan 3 keer gebruikt worden);

\*\*\* Low volume toepassing in 100 liter water per ha tijdens rustperiode van het gewas.

<sup>1</sup> Esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium aleophilum*);

<sup>2</sup> Botrytis (*Botrytis cinerea*/ *Botryotinia fuckeliana*).

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Roeren tijdens gebruik.

In de teelt van tomaat het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van tomaat toepassen zodra de eerste laterale apicale scheuten van tomatenplanten zichtbaar zijn (BBCH 21) tot de oogst (BBCH 89).

Bevat *Trichoderma atroviride* SC1. Micro-organismen kunnen sensibiliserende reacties veroorzaken.

In de teelt van druif kan de werking variabel zijn. Dit middel is gebaseerd op een micro-organisme en kan bijdragen aan de preventieve bestrijding van Esca in combinatie met preventieve maatregelen.

<b>Toepassingsstijdstip</b>	<b>Methode</b>
Na het klaarmaken van de onderstammen en stekken, vóór de koude bewaring	Onderdompelen van de onderstammen en stekken
Tijdens de rehydratatie, vóór het enten	Onderdompelen van de onderstammen en stekken